

**Semaine n°13 du 05 au 10 janvier 2026****Les matrices - première approche**

- Ensemble  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ , combinaison linéaire, multiplication. Toute matrice est combinaison linéaire de matrices élémentaires.
- Ensemble  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  : puissances de matrices carrées, formule du binôme. Ensemble de matrices diagonales, triangulaires supérieures, inférieures : stabilité par combinaison linéaire et produit.
- Matrices carrées inversibles, inverse d'une matrice, inverse d'un produit de matrices inversibles, ensemble  $\text{GL}_n(\mathbb{K})$ .
- Matrices d'opérations élémentaires : de transvection, de transposition (= permutation), de dilatation. Inversibilité de ces matrices. Traduction des opérations sur les lignes par produits à gauche par ces matrices.
- Interprétation matricielle des systèmes linéaires. Caractérisation de l'inversibilité d'une matrice par l'existence d'un inverse à droite **ou** à gauche. Calcul de l'inverse d'une matrice par opérations élémentaires ou par résolution d'un système.
- Transposée d'une matrice, transposée d'une somme, d'un produit, d'un inverse (notation  $A^T$ ). Matrices symétriques, antisymétriques.

**Déterminant**

- Existence et unicité d'une forme multilinéaire et alternée sur  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  et valant 1 sur  $I_n$  (admis).
- Propriétés du déterminant d'une matrice carrée. Effets des opérations élémentaires (sur les colonnes) sur un déterminant. Déterminant d'une matrice triangulaire.
- Une matrice carrée est inversible si et seulement si son déterminant est non nul.
- Liens entre déterminant et produit, inverse, transposée de matrices. Opérations sur les lignes d'un déterminant.
- Développement d'un déterminant par rapport à une ligne ou une colonne.

**Exercices**

**Exercice 1** Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  : s'il existe une matrice  $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  telle que  $A \times B = B \times A = I_n$ , alors cette matrice  $B$  est unique (*unicité de l'inverse d'une matrice inversible*).

**Exercice 2** Si  $A$  et  $B$  sont deux matrices triangulaires supérieures de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  (avec  $n \geq 2$ ), alors le produit  $A \times B$  est aussi une matrice triangulaire supérieure.

**Exercice 3** Soit la matrice  $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ . On pose  $J = A - 2I$  : calculer  $J^2$ , en déduire  $J^k$  pour tout  $k \geq 0$  puis une expression de  $A^n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

**Exercice 4** Soit la matrice  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ . On pose  $A = I + P$  : calculer  $P^3$ , en déduire une expression de  $A^n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

**Exercice 5** Décrire, en fonction de la valeur de  $m$ , l'ensemble des solutions du système

$$\begin{cases} mx + y = m+1 \\ x + my = 2 \end{cases}$$

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & -1 \\ 1 & \cdots & \cdots & \cdots & 1 \end{vmatrix}.$$

Montrer que, pour tout  $n \geq 2$ ,  $\Delta_{n+1} = 2\Delta_n$ . En déduire  $\Delta_n$ .

**Exercice 7** A l'aide de déterminants, résoudre le système suivant où  $m$  désigne un paramètre réel :

$$\begin{cases} mx + y + z = 1 \\ x + my + z = m \\ x + y + mz = m^2 \end{cases}$$

**Exercice 8** Soit  $A \in \mathcal{A}_{2n}(\mathbb{R})$ , une matrice carrée réelle, antisymétrique, d'ordre  $2n$  ( $n \in \mathbb{N}^*$ ). On définit la matrice  $J \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{R})$  dont tous les coefficients sont égaux à 1. Enfin, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \det(A + xJ)$ .

1. Montrer que  $f$  est une fonction paire.
2. A l'aide d'opérations sur des colonnes, montrer que la fonction  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  est affine i.e de la forme  $f(x) = ax + \beta$ .
3. Montrer que  $f$  est constante.
4. En déduire :  $\forall x \in \mathbb{R}, \det(A + xJ) = \det(A)$ .